



ПАМЯТКА ПАЦИЕНТА

ПОДГОТОВКА К МРТ

МРТ-брюшной полости или МРТ-забрюшинной полости.

За сутки до исследования необходимо придерживаться диеты, исключающую газообразования, а именно исключить: ржаной хлеб, молочные продукты, крашенную капусту, яблоки, виноград. За 4 часа до исследования не принимать пищу. За 20-30 минут принять препарат НО-ШПА или ДРОТАВЕРИН(1-2 таблетки) Необходимы предыдущие исследования (выписки, диски, протоколы, консультации доктора), всё, что связано с исследуемой области

МРТ-малого таза(жен.).

7-10 дней цикла, УЗИ малого таза, консультация гинеколога, если были операции все выписки. Обследование осуществляется при незначительно или умеренно наполненном мочевом пузыре. За несколько дней (2-3) до процедуры диета, предусматривающая исключение из употребления в пищу продуктов, способствующих образованию газов; очистительная клизма перед сном и утром в день обследования; прием спазмолитических препаратов (Но-шпа/Дротаверин) 1-2 таблетки за 20-30мин. до проведения процедуры.

В день исследования от последнего приема пищи до исследования должно пройти не менее 4 часов. Необходимы предыдущие исследования (выписки, диски, протоколы, консультации доктора), всё, что связано с исследуемой области

МРТ-малого таза(муж.) (простата).

Анализ ПСА обязательно, консультация уролога, УЗИ предстательной железы, если были операции/биопсии необходимы все выписки.

Обследование осуществляется при незначительно или умеренно наполненном мочевом пузыре. За несколько дней (2-3) до процедуры диета предусматривающая исключение из употребления в пищу продуктов, способных усиливать перистальтику кишечника и образование газов; очистительная клизма перед сном и утром в день обследования; прием спазмолитических препаратов (Но-шпа/Дротаверин) 1-2 таблетки за 20-30мин. до проведения процедуры.

В день исследования от последнего приема пищи до исследования должно пройти не менее 4 часов. Необходимы предыдущие исследования (выписки, диски, протоколы, консультации доктора), всё, что связано с исследуемой области

МРТ-прямой кишки.

Проведение клизмы не менее чем за 3 часа до исследования. За 4 часа не принимать пищу, за 30 минут принять таблетированный препарат НО-ШПА 1 таблетку. Необходимы предыдущие исследования (выписки, диски, протоколы, консультации доктора) всё что связано с исследуемой области.

МРТ гипофиза.

В основном проводится с контрастом.

Необходимо направление врача, а также результат анализа на пролактин, если пациента направил гинеколог.